Cutimed® Sorbact® gel Mode d'emploi

Cutimed® Sorbact® gel est une compresse enduite d'hydrogel conçue pour capter et éliminer efficacement les bactéries et les micro-organismes présents dans les plaies souillées, contaminées ou infectées.
Elle est constituée d'un support acétate imprégné d'un dérivé d'acide gras hautement hydrophobe: le DACC (chlorure de dialkylcarbamoyle), qui permet de fixer rapidement et de manière irréversible les microorganismes à sa trame. L'hydrogel assure le maintien d'un milieu humide au niveau de la plaie et favorise
le débridement naturel par autolyse des tissus nécrotiques.

Mode d'action

L'action de Cutimed® Sorbact® gel est purement physique et se base sur le principe de l'interaction hydrophobe: en milieu humide, les particules hydrophobes s'attirent et se lient les unes aux autres. La plupart des germes pathogènes ou entravant le processus de cicatrisation sont hydrophobes: les bactéries à Gram positif comme le Staphylocoque doré, le Staphylocoque doré résistant à la méticilline (SAMR) et les streptocoques ainsi que les bactéries à Gram négatif telles que l'Escherichia Coli et le Pseudomonas Aeruginosa mais aussi les champignons comme le Candida Albicans se fixent de manière irréversible sur la compresse Cutimed® Sorbact® gel.

Indications

Cutimed® Sorbact® gel peut être appliqué sur tous types de plaies sèches ou légèrement à modérément exsudatives, souillées, contaminées ou infectées, telles que:
- les plaies post-opératoires et les déhiscences
- les plaies traumatiques
- les plaies chroniques: escarres et ulcères veineux, artériels ou diabétiques
- les plaies consécutives à l'excision de fistules et les abcès cavitaires

Effets secondaires

Il n'y a pas d'effets secondaires ou de risque de cytotoxicité connus. Compte-tenu de son principe d'action exclusivement physique, il n'y a pas de risque de développer des résistances aux micro-organismes présents dans la plaie. Cutimed® Sorbact® gel est exempt de conservateurs. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue au propylène glycol.

Gamme de produits

Les compresses Cutimed® Sorbact® gel sont disponibles en deux tailles:
- 7,5 x 7,5 cm (réf. n° 72611-00)
- 7,5 x 15 cm (réf. n° 72611-01)

Recommandations d'utilisation et contre-indications

Cutimed® Sorbact® gel est un pansement primaire spécialement conçu pour les plaies sèches ou légèrement à modérément exsudatives, voire partiellement nécrotiques. En fonction de la quantité d'exsudat, il doit être fixé avec un pansement secondaire adapté afin d'éviter un assèchement de la plaie et donc un risque d'adhérence à la plaie. Veiller à effectuer un contrôle régulier de la plaie afin de pouvoir prendre des mesures adaptées en fonction de son évolution. Cutimed® Sorbact® gel ne doit pas être utilisé en combinaison avec des pommades ou des crèmes car elles empêchent la fixation des microorganismes sur la compresse. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue au propylène glycol.

Mode d'emploi

1. Nettoyer la plaie avec une solution stérile et appliquer Cutimed® Sorbact® gel de manière à couvrir toute la surface de la plaie. Si la compresse est trop grande et recouvre la peau périlésionnelle, replier cette partie de la compresse sur la plaie afin d'éviter le risque de macération autour de la plaie. Si nécessaire, ajouter l'hydrogel restant dans le sachet pelable sur la compresse en place.

2. Le contact direct entre la compresse et la plaie est la condition indispensable à la captation efficace des micro-organismes. Par conséquent, il convient, en cas de plaies profondes ou cavitaires, de bien appliquer Cutimed® Sorbact® gel sur les parois de la plaie afin que le contact entre la surface de la plaie et la compresse soit maximal. Recouvrir le cas échéant avec une compresse absorbante Cutimed® Sorbact®. Si nécessaire, enlever l'excédent de gel à l'aide d'une compresse stérile.

3. En cas de plaies cavitaires, laisser toujours une partie du pansement dépasser afin de pouvoir le retirer facilement.

4. En fonction de la quantité d'exsudat, recouvrir Cutimed® Sorbact® gel avec un pansement secondaire absorbant et /ou un film adhésif transparent.

5. La fréquence de renouvellement du pansement dépend de la quantité d'exsudat et du degré d'infection de la plaie. L'idéal est de changer le pansement tous les 1 à 3 jours. En cas de plaie présentant des signes cliniques d'infection, un contrôle plus fréquent de la plaie peut s'avérer nécessaire. Dans ce cas, il convient également d'étudier l'opportunité d'un traitement systémique adapté.

6. Lorsque la plaie est propre et que le processus de cicatrisation est relancé, il est recommandé de passer à d'autres types de pansements conçus pour le traitement des plaies en milieu humide.

Date de la dernière mise à jour de la notice

Avril 2007